

# 〈退院時のおくすりについて〉



## ケイツーシロップ(ビタミンK)

はたらき) ビタミンKの不足による出血を予防します  
つづける目安) 生後2~3ヶ月まで続けます

\* **週1回** 1回1包をのませてください  
新生児病棟では毎週水曜日に内服しています

## 出血予防



## アルファロール散(ビタミンD)

はたらき) カルシウム、リンの吸収を促し、ビタミンの不足によって起こる、骨の疾患を改善します

つづける目安) 身長伸びなど、成長をみながら続けます  
\* ビタミンDは、外気浴など紫外線を浴びることによって、体内でもつくられます

吸収を良くします

## リン酸水素カルシウム(リン・カルシウム)

はたらき) 骨の形成に必要なリン、カルシウムを補います  
つづける目安) 予定日から1~2か月を目安に続けます

## 骨をつくる



## ポラプレジンク顆粒(亜鉛)

はたらき) 貧血を改善したり、皮膚の状態を保ちます  
つづける目安) 予定日から1~3か月を目安に続けます

## インクレミンシロップ(鉄)

はたらき) 鉄の不足によって起こる貧血を改善します  
つづける目安) 離乳食開始の頃まで補充します

\* 一時的に便が黒くなるがありますが、  
服用を中止すると回復します

## 貧血の改善



# <服用しているおくすりについて>

## ポラプレジンク顆粒(亜鉛)

はたらき) 貧血を改善したり、皮膚の状態を保ちます  
つづける目安) 予定日から1~3か月を目安に続けます

## インクレミンシロップ(鉄)

はたらき) 鉄の不足によって起こる貧血を改善します  
つづける目安) 離乳食開始の頃まで補充します

\* 一時的に便が黒くなることがありますが、  
服用を中止すると回復します

貧血の改善



## パンビタン末(総合ビタミン剤)

## ユベラ顆粒(ビタミンE)

はたらき) 小さく産まれたお子さんへ栄養を  
補い、成長を助けます

## アルファロール散(ビタミンD)

はたらき) カルシウム、リンの吸収を促し、ビタミンの不足によって  
起こる、骨の疾患を改善します

つづける目安) 身長伸びなど、成長をみながら続けます

\* ビタミンDは、外気浴など紫外線を浴びることによって、  
体内でもつくられます

出血予防



## ケイツーシロップ(ビタミンK)

はたらき) ビタミンKの不足による出血を予防します  
つづける目安) 生後2~3ヶ月まで続けます

\* **週1回** 1回1包をのませてください  
新生児病棟では毎週水曜日に内服しています

吸収を良くします

## リン酸水素カルシウム(リン・カルシウム)

はたらき) 骨の形成に必要なリン、カルシウムを補います  
つづける目安) 予定日から1~2か月を目安に続けます

骨をつくる

